



Rue du Château-d'En Bas 33, 1630 Bulle
026 916 14 80
Pediabulle@pediabulle.ch



Surveillances post-vaccination

Après un vaccin, il arrive que l'enfant présente une **rougeur, douleur et/ou léger gonflement** à l'endroit où le vaccin a été injecté. Il peut également présenter des **maux de tête**, de la **fièvre**, des **courbatures** ou encore se montrer quelque peu **somnolant ou grognon**. Il est également possible qu'il ait **moins d'appétit** que d'habitude. Ces réactions sont fréquentes et ne durent pas plus de 2 jours.

Dans les **48h** suivant la vaccination de votre enfant :

- Si votre enfant est inconfortable, vous pouvez donner un suppositoire de Chamomilla comp. Supp (Weleda), jusqu'à 3x maximum par jour.
- Si votre enfant présente de la fièvre (plus de 38.5°T), vous pouvez donner un suppositoire de Dafalgan (posologie selon le poids de votre enfant), jusqu'à maximum 4x par jour.

Contactez-nous au **0269161480** en cas de fortes fièvres, supérieure à 39°C, éruption cutanée ou pleurs inconsolables par exemple.

Ce sera également le cas si votre enfant se montre anormalement apathique ou endormi, ou bien si une inflammation très importante et douloureuse apparaît au niveau du point d'injection et s'aggrave.

Source

Office fédérale de la Santé publique, Plan de vaccination suisse 2019 Mpedia.fr Infovac.ch